

Vänligen svara på följande frågor och skriv dina svar i ett mejl - glöm inte att numrera dina svar - och skicka mejlet till din instruktör.



McLOUGHLIN
SCAR TISSUE RELEASE

Jag önskar dig lycka till!

1. MSTR® ärrvävnadsteknik påverkar kroppen positivt på flera sätt. Ge FEM exempel!
2. Nämn FYRA typer av operationsärr, där behandlingen ofta triggat igång emotionell frigörelse!
3. Beskriv kort hur du skulle förhålla dig till en klient, om en behandling har triggat igång emotionell frigörelse!
4. Nämn TIO symptom och effekter, antingen i akut eller kroniskt stadie, som kan orsakas av ett ärr!
5. Vilka akupunkturmeridianer skulle bli avbrutna av ett ärr som går tvärs över magen, t ex av ett kejsarsnittsärr?
6. Hur länge måste du MINST vänta efter en operation, innan du funderar på att behandla ärr med MSTR®?
7. Ibland återkommer inte känsel och förmimmelser, trots behandling med MSTR®. Vad kan det bero på?
8. Det generella tempot i den här tekniken är ganska långsam. Varför?
9. Hur kommer det sig att ett ärr som känns hårt och fibröst ofta ändrar sig och blir mjukt och smidigt?
10. Själva greppet utförs ganska snabbt i den här tekniken. Varför?
11. Varför anses alla ärr på kroppen vara trauman?
12. Blod- och lymfflöde ökar ofta i och omkring ärr, med den här tekniken. Förklara varför!
13. Ibland undviker man att arbeta på ett nytt ärr, trots att den rekommenderade minimitiden har passerat. Varför?
14. Vilken typ av ärr kan visa sig som högersidig ryggsmärta?
15. Varför är det viktigt att behandla ärrvävnad på magen när någon har ont i ryggen?
16. Sant eller falskt? Bör man undvika att behandla ärr där det finns inopererade skruvar och plattor? Motivera!
17. Varför ska vi inte arbeta mer än max 15 minuter (under samma behandlingssession) på långa ärr, som t ex ärr från kejsarsnitt eller utbyte av knäled?
18. Hur kommer det sig att ett ärr verkar krympa, eller reduceras lite i storlek, efter behandling med MSTR®?
19. Nämn några kontraindikationer eller situationer där man måste vara försiktig när man utövar MSTR®!
20. Vad är den rekommenderade MAXTIDEN för behandling av små ärr, t ex ärr från blindtarmsoperationer eller carpaltunnelärr?